


## Taðing við súrløgi

Ein roynd bleiv gjørd at taða gamlan bø við súrløgi úr laksasløgvi. Endamálið við royndini var, at kanna hvussu nógv grasið sviðist av súrløginum og at fylgja við hvussu long tíð gongur, til grasvøksturin aftur er í lagi. Grasúrtoðkan bleiv ikki skrásett. Hitaviðgjørdur súrløgi bleiv fingin til vega frá Salmon Proteins á Eiði. Súrløgurin bleiv blandaður við vatni í seks ymiskum lutføllum og sprændur á bøin 3. juni 2009. Blandingslutfallið var í prosentum:

Súrløgur	Vatn
100	0
80	20
60	40
40	60
20	80
0	100

Úrslitið vísti, at har óblandaður súrløgur bleiv koyrdur á, bleiv at kalla alt grasið avsviðið. Og hóast vatn bleiv blandað uppí, bleiv eisini nógv avsviðið. Væl meira enn helmingurin av grasinum bleiv sviðið av, hóast vatnprosentíð var 80. Men eftir stuttari tíð fór bøurin at koma fyri seg aftur, og aftaná seks vikur var hann grønur aftur.



*Mynd... Sviðing av grasi í seks vikur aftaná viðgerð við ymiskum blandingum av vatni og súrløgi. (100: einki sviðið, 0: alt sviðið)*

Niðurstøðan av royndini er, at súrløggur svíðir grasið, men um sprænt verður meðan gróður er, er grasið komið fyri seg aftur aftaná seks vikur, eisini um súrløggurin er óblandaður. Hvørki grasúrþøkan ella grassamansetingin bleiv kannað.



Mynd... Vinstrumegin taðað við súrløgi. Høgrumegin óviðgjørt.